

VisiodiS®

Collyre

Chlorure de benzalkonium

FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre en flacon compte-gouttes prêt à l'emploi de contenance 10 ml.

COMPOSITION :

Chlorure de benzalkonium 0,01 g

Excipients :

Phosphate monosodique, phosphate disodique, édétate disodique, chlorure de sodium, eau distillée de camomille, eau distillée de hamamelis et eau distillée de rose.

Eau pour préparations Injectables E.P.P.I q.s.p. 100ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Désinfectant oculaire.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Désinfection de la muqueuse oculaire.

CONTRE INDICATIONS :

Hypersensibilité à l'un des composants de la solution .

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Après une brève période de traitement sans résultats appréciables, consulter un médecin spécialiste.

- Ne pas utiliser pendant le port de lentilles de contact.

- En cas d'application du produit, remettre les lentilles de contact 15 min après l'utilisation.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

- Une instillation oculaire d'une goutte ou deux, 1 à 4 fois par jour.

- Ne pas dépasser les doses prescrites .

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans.

EFFETS INDESIRABLES :

- Aucun effet indésirable n'a été signalé à ce jour.

- En cas d'effets indésirables survenus au cours du traitement, le patient doit les signaler à son médecin traitant ou à son pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Le produit peut être utilisé au cours de la grossesse et de l'allaitement.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Le produit n'influence pas les capacités de conduire et d'utiliser les machines.

CONSERVATION :

- A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

- Reboucher le flacon après usage.


- Vérifier la date de péremption qui se trouve sur l'étui.

- Tout flacon entamé doit être utilisé dans 15 jours qui suivent son ouverture.

PRESENTATION :

Boite de 01 flacon de 10ml

A.M.M. N° 923314 1



Les laboratoires Médis - S.A.
Route de Tunis - Km7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tél : (216) 72 235 006 Fax : (216) 72 235 106



VisiodiS®

Eye drops

Benzalkonium chloride

PHARMACEUTICAL FORM :

Eye drops ready to be use in 10 ml bottle.

COMPOSITION:

Benzalkonium chloride 0,01 g

Excipients :

Monosodium phosphate, disodium phosphate, disodium edetate, sodium chloride, camomile distilled water; hamamelis distilled rose water.

Water For Injections W.F.Is.q.f. 100 ml

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS :

Disinfectant ocular.

THERAPEUTIC INDICATIONS :

Disinfection of ocular mucosa.

CONTRAINDICATIONS :

Hypersensitivity to any component of the solution .

PRECAUTIONS OF USE :

- After a brief period of treatment without significant results, consult a specialist doctor.

- Do not use while wearing contact lenses.

- When applying the product, return the contact lenses 15 minutes after use.

USE AND DOSAGE:

- An ocular instillation of a drop or two, 1-4 times a day.

- Do not exceed recommended dose.

- Do not use in children under 6 years.

ADVERSE EFFECTS :

No adverse effects have been reported to date.

If adverse effects during treatment, the patient should report them to his doctor or pharmacist.

PREGNANCY AND BREAST FEEDING:

The product can be used during pregnancy and lactation.

DRIVING AND USING MACHINES:

The product does not affect the ability to drive and use machines.

CONSERVATION:

- Keep protected from light and heat.
- Cap the bottle after use.
- Check the expiration date mentioned on the bottle
- The product should not be used beyond 15 days of first opening the bottle.

PRESENTATION :

Box of one eye-drops bottle of 10 ml : M.A. : 923 314 1

THIS IS A DRUG

- A drug is a product but not like the others
- A drug is a product that is on your health and its non-conformity with the requirements consumption exposes you to danger.
- Follow strictly the doctor's prescription and the instructions that tells you to follow the advice of your pharmacist.
- Your doctor and pharmacist know about the drug, its indications and cons-indications.
- Do not stop your own treatment during the prescribed period.
- Do not pick up, do not increase the dose without consulting your doctor.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants

Les laboratoires Médis - S.A.
Route de Tunis - Km7 - BP 206 - 8000 Nabeul - Tunisie
Tél : (216) 72 235 006 Fax : (216) 72 235 106



NO 0610
V04

الحمل و الرضاعة :

يمكن استعمال هذا الدواء خلال الحمل أو الرضاعة .

السياقة و إستعمال الآلات :

هذا الدواء لا يؤثر على قدرات السياقة أو استعمال الآلات.

طريقة الحفظ :

- يحفظ بعيدا عن الضوء والحرارة.
 - تطلق الحاوية مباشرة بعد الاستعمال.
 - تثبت من تاريخ صلوحية المستحضر الموجودة على الحاوية.
 - يستعمل هذا المستحضر في ظرف 15 يوما من تاريخ فتح الحاوية لأول مرة.
- التقديم :**
علبة تحتوي على وحدة ذات 10 مل من المستحضر تأشيرة 923 314 1.

إن هذا دواء
- الدواء مستحضر ولكن ليس كثيره من المستحضرات
- الدواء مستحضر يؤثر على سحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات بحرصك للخيار.
- تقع بصفة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها
- تعد تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك كالمهاتيب و الصيدلاني هما الخياران بالدواء و بنتمه و ضرره.
- لا تطلع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
- لا تمد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب
لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مخبر مدينس ش.خ.إ.
طريق تونس كم 7 ص ب 206 - 8000 نابل - تونس
الهاتف (216) 72 235 006 - الفاكس (216) 72 235 106

فيزيوديس

قطرات للعين بنزلكينيوم الكلورير

الشكل :

مستحضر جاهز للاستعمال قطرات معقمة للعين ذات 10 مل.

التركيبية :

بنزلكينيوم الكلورير 0,01 غ

سوانع مختلفة :

الكلورير البنزلكينيوم، فوسفات المنوسوديوم، اينديطاط الصوديوم، كلورير الصوديوم، ماء المقطر الكاوميل، ماء الورد المقطر، ماء الهاماميليس المقطر.

ماء مقطر للحقن ك . ك . ل. 100 مل

الخصائص الدوائية:

تقديم العين.

دواعي الاستعمال:

تقديم العين.

مضادات الاستعمال:

حساسية لأحد عناصر المستحضر.

احتياطات الاستعمال:

- بعد استعمال الدواء لفترة قصيرة دون ظهور نتائج ايجابية يجب استشارة

طبيب أخصائي.

- لا يجب استعمال هذا الدواء عند حمل عصابات لاصقة.

- عند استعمال هذا الدواء يجب وضع العدسات اللاصقة بعد 15 دقيقة من الاستعمال.

- لا يجب استعمال هذا المستحضر عند الأطفال دون 6 سنوات.

طريقة الاستعمال:

- تقطير قطرة أو اثنتين في العين ، إلى 4 مرات في اليوم.

- لا يجب تجاوز المقدار الموصوف من الطبيب.

نتائج غير مرغوبة:

لم يلاحظ إلى حد اليوم نتائج غير مرغوبة.

في حالة ظهور نتائج غير مرغوبة خلال استعمال الدواء، يجب على المريض اخبار الطبيب

المباشر أو الصيدلاني.